（使用資材選択）

令和8年9月16日　作成

令和8年産「YES!clean栽培米」栽培管理記録集計表栽

栽培責任者	そらち南減農薬米生産組合 事務局	確認責任者	そらち南農業協同組合 事務局
住　　所	栗山町中央3丁目104番地	住　　所	栗山町中央3丁目104番地
T　E　L	0123-72-1313	T　E　L	0123-72-1313

印　　印

作型	品種	面積 (a)	反収 (kg/10a)	収穫量 (t)	左記の内ホクレン委託数量 (t)	防除 作業名	防除 防除時期
うるち（移植）	ななつぼし	8,600	450	387.0	387.0	種子消毒 苗箱処理 除草 本田防除 本田防除 本田防除	4/2～4/5 5/10～5/15 6/2～6/7 7/18～7/24 8/1～8/6 8/11～8/14
計		8,600		387.0	387.0		

農薬

作業名			YES!clean栽培 使用農薬商品名	使用量	用途	成分名	成分数	備　考
種子消毒			温湯消毒	60℃／10分	殺菌	－	0	どちらかを選択
			エコホープDJ	200倍／24時間浸漬		トリコデルマ アトロビリデSKT-1		
苗箱処理	播種時（覆土前）～移植当日	イネドロオイムシ	パディート箱粒剤	中苗　1箱当り50g 成苗　1箱当り30g	殺虫	シアントラニリプロール	1	（使用時期により）いづれかを選択
			バズ顆粒水和剤	中苗　1000倍／1箱当り500mℓ 成苗　1000倍／1箱当り300mℓ		シアントラニリプロール		
			ヨーバルキングフロアブル	中苗　400倍／1箱当り500mℓ 成苗　400倍／1箱当り300mℓ		テトラニリプロール		
	移植3日前～移植当日	いもち病	ブイゲットフロアブル	50倍／1箱当り500mℓ	殺菌	チアジニル	1	移植3日前～移植当日まで
	移植7日前～移植当日	イネドロオイムシ いもち病 同時防除	ブーンバズSC	中苗　500倍／1箱当り500mℓ 成苗　500倍／1箱当り300mℓ	殺虫・殺菌	殺虫：シアントラニリプロール 殺菌：ジクロベンチアゾクス	2	いづれかを選択
	播種時（覆土前）～移植当日		プーンパディート箱粒剤	中苗　1箱当り50g 成苗　1箱当り30g				
	播種時（覆土前）		アプライパディート粒剤	中苗　1箱当り50g 成苗　1箱当り30g		殺虫：シアントラニリプロール 殺菌：チアジニル		
除草剤		初期剤	ピラクロンフロアブル	500mℓ／10a	除草	ピラクロニル	1	初期剤必要な場合のみ使用 移植時～ノビエ葉令1葉まで （いづれかを選択）
			又はピラクロン1キロ粒剤	1kg/10a				
			ピラクロンジャンボ	300g/10a				
			先陣200FG	200g/10a		ジメタメトリン ピラクロニル	2	
		初中期一発剤	レオゼータ1キロ粒剤	1kg/10a		フェンキノトリオン プロピリスルフロン ブロモブチド	3	移植時又は移植直後からノビエ葉令3.5葉まで（いづれか1剤を選択）
			レオゼータフロアブル	500mℓ／10a				移植後3日からノビエ葉令3.5葉まで（いづれか1剤を選択）
			レオゼータジャンボ	30g×10個／10a				
			レオゼータ300FG	30g×10個／10a				
		後期剤	ワイドアタックSC	100mℓ／10a（散布水量100ℓ）		ペノキススラム	1	必要な場合のみ使用
本田基幹防除		いもち病	ビーム粉剤DL	3～4kg/10a	殺菌	トリシクラゾール	1	キラップ・トレボンエクシードとの混用も可（いづれか1剤を選択）
			ビームゾル(散布)	1000倍／10a				
			ビームゾル(ヘリ用)	6～8倍／10a（散布量800ml/10a）				
			ビームエイトゾル(散布)	1000倍／10a（散布量60～150L/10a）				
			ビームエイトゾル(ヘリ用)	5～8倍／10a（散布量800ml/10a）				
		いもち病 カメムシ 同時防除	ビームトレボン粉剤5DL	3～4kg/10a	殺虫・殺菌	殺虫：エトフェンプロックス 殺菌：トリシクラゾール	2	穂揃い期（出穂から7～10日）（いづれか1剤を選択）
			ビームエイトトレボンゾル(散布)	650倍／10a（散布量100～150L/10a）				
			ビームエイトトレボンゾル(ヘリ用)	5倍／10a（散布量800ml/10a）				
			ビームエイトエクシードゾル(散布)	1000倍／10a（散布量60～150L/10a）		殺虫：スルホキサフロル 殺菌：トリシクラゾール		
			ビームエイトエクシードゾル(ヘリ用)	8倍／10a（散布量800ml/10a）				
本田臨機防除		カメムシ	キラップ粉剤DL	3～4kg/10a	殺虫	エチプロール	1	カメムシ多発時（いづれか1剤を選択）
			キラップフロアブル(散布)	1000～2000倍／10a（散布量60～200L/10a）				
			キラップフロアブル(ヘリ用)	8～16倍／10a（散布量800ml/10a）		スルホキサフロル		
			エクシードフロアブル(散布)	2000倍／10a（散布量60～150L/10a）				
			エクシードフロアブル(ヘリ用)	16倍／10a（散布量800ml/10a）				
		紋枯病 疑似紋枯症	バリダシン液剤5	1000倍／10a（散布量60～150L/10a）	殺菌	バリダマイシン	0	紋枯病発生および発生しやすい時（どちらかを選択）
			バリダシン粉剤DL	3～4kg/10a				
成分回数計								9回以下

慣行栽培における化学合成農薬成分使用回数＜参考＞

作型	殺菌剤	（種子消毒）	殺虫剤	殺虫・殺菌剤	除草剤	植調剤	合計
うるち（移植）	7回	（4回）	5回	5回	5回	0回	22回
うるち（直播）	6回	（6回）	11回	0回	5回	0回	22回
もち（移植）	5回	（4回）	4回	7回	5回	0回	21回

肥料（施用量：kg/10a）

化学肥料窒素施用量計	7kg

慣行栽培における窒素施用量＜参考＞

化学肥料施肥量（kg/10a）	10.0kg

備考
・エコホープDJ・バリダシン液剤5・バリダシン粉剤DLは生物農薬のため成分数にカウントしない。
・年産が事なるため、ホームページと内容が異なる。

注1)「作業名」は、種子消毒・苗箱処理・土壌消毒・本田防除・除草別を記入する。
注2)「用途」は、殺菌・殺虫・除草別を記入する。